Riproduzione

asessuata o agama sessuata o gamica

RIPRODUZIONE GAMETOGENESI FECONDAZI


# La RIPRODUZIONE SESSUATA, prevede negli organismi diploidi, i seguenti eventi:


 $\downarrow$ 


formazione di gameti aploidi: GAMETOGENESI

unione dei gameti: FECONDAZIONE


differenziamento di **organi specializzati** a compiere questi processi e di particolari **comportamenti** finalizzati all'accoppiamento: DIFFERENZIAMENTO DEL SESSO sulla base della DETERMINAZIONE DEL SESSO









## PERCORSO DEGLI SPERMATOZOI NELLE







## RUOLO DEL TESTOSTERONE

## Prima della nascita:

stimola lo sviluppo degli organi sessuali primari e la discesa dei testicoli nello scroto

## Pubertà:

Pubertà:

catto di crescita
sviluppo strutture riproduttive
e caratteri secondari maschili\*

Adulto:
mantenimento dei caratteri secondari
stimola la spermatogenesi

Caratteri associati agli ormoni sessuali, ma non direttamente

## OVOGENESI:

## DA OVOGONI A OVOCITI di II ORDINE

in genere cellule GRANDI (confronto dimensionale tra varie specie)

## uovo umano



frog egg

**Differenze** spermatogenesi - ovogenesi:


a) 4 spermatozoi <u>maturi</u> contro 1




# Apparato riproduttore femminile Ovaie OVAIA

## Ricordiamo la MEIOSI


## **OVOGENESI**



1 OVOCITA SECONDARIO E 3 GLOBULI POLARI



**NASCITA: 1-2 MILIONI FOLLICOLI PRIMARI** 



CICLO OVARICO: completamento ciclico dell'ovogenesi che avviene periodicamente e consiste in modificazioni cicliche dell'ovario, sollecitato dalla attività della ipofisi


teoricamente: periodo che intercorre tra due ovulazioni successive in pratica: **periodo che intercorre tr** 

## Fase follicolare e luteinica Sviluppo del follicolo


Dal pool di **follicoli primordiali** presenti alla nascita a partire dalla pubert □21 □

alcuni follicoli inizieranno a svilupparsi in modo continuo e progrediscono nel differenziamento attraverso i seguenti stadi:


- 1- richiamo di alcuni follicoli dal pool quiescente
- 2- accrescimento
- 3- selezione del follicolo dominante
- 4- ovulazione
- 5- luteinizzazione (fase luteinica)









## **OVULAZIONE**




# *RIASSUMENDO*Stadi sviluppo follicolo

- Proliferazione delle cellule della granulosa ed acquisizione di recettori per FSH ed ormoni steroidei
- Ovocita aumenta di diametro (follicolo secondario)
- Inizia a formarsi la membrana pellucida
- •Differenziazione cellule della teca (follicolo pre-antrale)
- Accumulo del *liquor follicoli* e differenziamento di una popolazione di cellule del cumulo ooforo e una parietale che acquisisce recettori per LH e capacità steroidogenica (follicolo antrale)
- L'ovocita si è ingrandito, ha accumulato RNA specifici ed acquisisce competenza meiotica
- Ovulazione del follicolo dominante e atresia degli altri







sessualità e riproduzione

## Fecondazione - tappe (in genere)


- 1) avvicinamento dei gameti
- 2) penetrazione delle barriere che circondano l'uovo
- 3) reazioni dell'uovo
- 4) unione dei cromosomi (materiale genetico dei genitori) sessualità

SEME SPERMATOZOI + FLUIDO SEMINALE
2-4 ml ghiandole seminali
200-400 x 10<sup>6</sup> accessorie
75% non anomali

## FECONDAZIONE <u>INTERNA</u> PERCOR



2- VAGINA(coagulo per pH acido poi sciolto, spermatozoi qui per 20-60min)





PENETRAZIONE SPERMATOZOO: 15-20 MIN ENTRA NUCLEO SPERMATOZOO + CENTRIOLO

## 4) REAZIONI DELL'UOVO FERTILIZZATO

BLOCCO DELLA POLISPE



